

販売名：サイレンQ

第2類医薬品



効能・効果：切傷、すり傷、さし傷、かき傷、靴ずれ、創傷面の殺菌・消毒

用法・用量：1日数回、患部に噴霧又はガーゼ、脱脂綿に浸して塗布する。

成分・分量：本品(60mL)中

ジブカイン塩酸塩 ..... 60mg  
クロルフェニラミンマレイン酸塩 ..... 120mg  
ナファゾリン塩酸塩 ..... 60mg  
ベンゼトニウム塩化物 ..... 60mg

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

⚠ 使用上の注意

相談すること

1205-AIP

1.次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)患部が広範囲の人。(4)深い傷やひどいやけどの人。2.使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので直ちに使用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3.5~6日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この製品をもって医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること。  
【用法及び用量に関する注意】(1)小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させること。(2)目に入らないように注意すること。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗うこと。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けること。(3)外用にのみに使用すること。

【保管及び取扱い上の注意】(1)直射日光の当たらない涼しい場所に密栓して保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になり品質が変わる)。60mL 650円+税



キャップ、ノズル、ボトル、  
外装フィルム、ラベル

製造販売元 株式会社 雪の元本店  
奈良県橿原市大谷町182番地  
TEL: 0744-22-2440

4979949000586