

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読み下さい。
また、必要なときに読めるよう大切に保管して下さい。

虫さされ、しっしん、かゆみ、じんましん、かぶれに

新スキントールS

第3類医薬品

カ、ノミ、イエダニなどの虫に刺されると、刺されたところが赤く腫れてかゆみや痛みが起きます。これは、ヒスタミン、セロトニン、アセチルコリンなどの化学物質によって引き起こされるアレルギー反応の一種です。

本剤にはヒスタミンの遊離を抑える作用を持ったジフェンヒドラミンや、かゆみ、痛みを和らげるサリチル酸メチルなどの成分を配合しております。

虫に刺されたとき、患部をかくと、余計にかゆみが増し、腫れや痛みが強くなります。新スキントールSを塗って、そっとしておくのがいいでしょう。

新スキントールSは、ステロイド剤は配合しておりませんので、お子様からお年寄りまで、安心してご使用いただけます。

⚠ 使用上の注意

相談すること



1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (3) 湿潤やただれのひどい人。

2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関 係 部 位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ

3. 5～6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

《効能又は効果》

かゆみ、虫さされ、湿疹、じんましん、かぶれ

《用法及び用量》

患部を清潔にしたのち、1日2～3回適量をすりこむ。又は症状に応じてガーゼに適量を塗布して患部に貼付する。

《用法及び用量に関連する注意》

- (1) 定められた用法・用量を守ってください。
- (2) 目に入らないように注意してください。万一、目に入った場合には、すぐに水又はぬるま湯で洗ってください。なお、症状が重い場合には、眼科医の診療を受けてください。
- (3) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (4) 外用にのみ使用してください。

《成分及び分量》 本品100g中

ジフェンヒドラミン	1.0g
l-メントール	5.0g
dl-カンフル	6.0g
サリチル酸メチル	3.0g

(添加物として、セタノール、サラシミツロウ、流動パラフィン、プロピレングリコール、カルボキシビニルポリマー、マクロゴール、自己乳化型ステアリン酸グリセリン、ポリオキシエチレン硬化ヒマシ油、キサンタンガム、トコフェロール酢酸エステル、水酸化Na、パラベンを含有する。)

《保管及び取扱い上の注意》

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めのお店または下記までご連絡ください。

〒634-0815 奈良県橿原市大谷町182番地
株式会社 雪の元本店 お客様相談室
受付時間 9:00~12:00 13:00~17:00
(土曜、日曜、祝日を除く)
TEL 0744-22-2440 FAX 0744-22-2406

副作用被害救済制度のお問い合わせ先
(独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

製造販売元 株式会社 **雪の元本店**
奈良県橿原市大谷町182番地